La situation de *L'Abeille* est convenable et point n'est nécessaire d'entamer la réserve qui lui est spéciale.

Observations diverses.

Capture. — M. l'abbé J. de Joannis signale la capture d'un exemplaire de *Schoenobius gigantellus* Schiff. par M. E. Moreau, à Janville (Seine-et-Oise), en juillet. Cet exemplaire est une ♀, de grande taille, de 45 millim. d'envergure.

Communications.

Chasses de M. Carlos Bruch dans l'Argentine. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de Cérambycides [Col.]

par E. Gounelle.

Ranqueles, nov. gen. — *Palpi subaequales, art. ultimo brevi, depresso apiceque truncato; mandibulae breves, apice arcuatae, simplices; genae brevissimae, angulo inferiore acuminato; oculi rude granulati, valde lunati, lobo inferiore subtriangulari, magno; caput breve, vertice convexo, in medio tuberculato, fronte transversa, depressa, tuberculis antenniferis sat productis, valde incisis, intus nodulosis; Antennae* (♀ ?) *11-articulatae, capite thoraceque haud duplo longiores, basi cylindricae, apice compressae, art. 3 scapo perparum longiore, art. 4 brevissimo, art. 1-3 ceteris simul sumptis vix brevioribus, art. 5-7 intus apice dentatis, art. 8-9 angulatis; prothorax subglobosus, lateraliter inermis, capite duplo latior, antice posticeque marginatus; scutellum subrotundum; elytra elongata, parallela, disco depressa, apice truncata, angulis externis rotundatis, suturalibus haud productis; acetabula antica postice, intermedia extus hiantia; coxae anticae subrotundatae; pedes intermedii et postici anticis longiores, femora lineata, compressa, tibiae etiam compressae, tarsorum art. 1us 2o et 3o simul sumptis vix brevior; unguiculi simplices, robusti; prosterni processus intercoxalis angustus, apice abrupte truncatus; mesosterni processus modice latus, apice paulo lunatus; metasternum in medio canaliculatum; abdomen segmentis 5 subaequalibus compositum; corpus elongatum supra et subtus pubescens.*



Cette forme nouvelle ne me paraît pas pouvoir se placer autre part que dans le groupe des *Hesperophaninae*. Outre les caractères généraux du groupe en question (yeux à facettes assez grossières, mandibules courtes, arquées et aiguës au bout, joues courtes, hanches antérieures subglobuleuses, leurs cavités cotyloïdes ouvertes en arrière, celles des intermédiaires ouvertes en dehors, saillie mésosternale échancrée en arrière), le genre *Ranqueles* présente quelques particularités de structure propres à certains genres dont il semble se rapprocher davantage. La forme si caractéristique du corselet rappelle en effet de très près celle de ce même organe chez plusieurs espèces d'*Achryson* et d'*Anoplomerus;* les élytres sont allongés, parallèles. pubescents, arrondis en arrière comme dans les genres *Hesperophanes* et *Stromatium*. Mais les antennes ont une structure très spéciale, et c'est là le caractère distinctif le plus saillant du nouveau genre que j'ai cru devoir établir.

Ranqueles mus, nov. spec. — *Rufo-ferrugineus, griseo-pubescens, pilis rufis paulo erectis sparsim intermixtis; caput inter antennas canaliculatum, vertice tuberculo transverso, nigro, laevi ornato; antennae basi hirtae; prothorax supra et subtus nigro-granulatus, disco bituberculatus et carinatus — tuberculis et carina nigris, nitidis — depressioneque triangulari postice impressus; scutellum dense pubescens et longitudinaliter in medio sulcatum; elytra latitudine duplo multo longiora, vellere griseo marmorata, singulatim obtuse tricostata, costis duabus externis ante apicem evanescentibus, costa interna obliqua et valde abbreviata.* — Long. : 38 mill.; lat. hum. : 10 mill.

République Argentine, province de Mendoza (C. Bruch, novembre 1896); 1 ex.

Description du sexe mâle de *Acinopus pilipes* Piochard de la Brûlerie [Col.]

par R. Jeannel.

Au cours de l'excursion organisée en avril 1905 par le laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer, j'ai eu l'occasion, dans l'île de Majorque, de prendre une série d'*Acinopus* où, au milieu de *picipes* Olivier, il m'a été donné de retrouver un individu ♂ d'une espèce décrite sur une ♀ en 1867 par Piochard de la Brûlerie et à ma connaissance jamais signalée depuis. Je crois donc d'autant plus utile de donner une courte description du sexe ♂ que certains auteurs semblent avoir tendance à mettre en synonymie une excellente espèce qui n'a que le tort d'être restée mal connue jusqu'à présent.

Acinopus pilipes Piochard de la Brûlerie est décrit sur une ♀ dans : *Ann. Soc. ent. Fr.* [1867], *Bull.*, p. 79; *Ann. Soc. ent. Fr.* [1869], p. 24; *Ann. Soc. ent. Fr.* [1873], p. 255 (Revision du genre *Acinopus* par Piochard de la Brûlerie).

Sexe ♂ : taille : 12 mill. Ensemble du corps très peu convexe, coloration brunâtre relativement claire; tête petite chez le ♂, n'atteignant pas la largeur du prothorax; mandibules non échancrées, à bord supérieur sinué à la moitié de sa longueur, à bord inférieur régulier; la gauche est légèrement plus forte que la droite. Prothorax allongé, peu convexe, rétréci notablement en arrière, arrondi sur les côtés; angles antérieurs mousses, angles postérieurs arrondis, légèrement impressionnés.

Élytres parallèles, rétrécis dans leur quart postérieur.

Dessous du corps hérissé de longues soies claires; prosternum et mésosternum à ponctuation légère et espacée; abdomen lisse, dernier segment nullement ridé.

Antennes, palpes et pattes ferrugineuses; cuisses postérieures lisses, présentant 10 à 12 soies sur leur bord postérieur; tarses antérieurs et moyens dilatés et portant des squamules sur leur face ventrale; deuxième article des tarses intermédiaires plus long que large.

Un individu ♂ provenant des environs d'Arta près de Manacor, dans l'île de Majorque.